Piyasaya sunacağımız ürünler üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt ederim. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederim.

EC FERTILIZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

PROLEAF

HIGH P

12-42-8+(2.5MgO)+ME

TEKTAR TEKNİK TARIM TİC.SAN.VE PAZ.A.Ş.
Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Mirador İş Merkezi
No: 3 Kat: 4 D: 25 Muratpaşa - ANTALYA
Tel: 0.242. 311 56 11- 312 93 74 Fax: 0.242. 312 93 75
Antalya Kurumlar V.D. - Vergi No: 836 044 1754
Mersis No: 0-8360-1283-8400014 - Tic.Sicil No: 31142
www.tektar.com.tr - info@tektar.com.tr

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% w/w
Toplam Azot (N)	12.0
- Nitrat Azotu (N)	1.9
- Amonyum Azotu (N)	7.3
- Üre Azotu (N)	2.8
Suda Çözünür Fosfor pentoksit (P_2O_5)	42.0
Suda Çözünür Potasyum oksit (K_2O)	8.0
Suda Çözünür Magnezyum oksit (MgO)	2.5
Suda Çözünür Bor (B)	0.02
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA şelatlı	0.015
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı DTPA şelatlı	0.12
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA şelatlı	0.06
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0.01
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA şelatlı	0.015

Cu, Mn, Zn EDTA şelatlarının stabil olduğu pH aralığı: 2-9
Fe DTPA şelatının stabil olduğu pH aralığı: 3-10

Suda Tamamen Çözünür

Net: 1kg

8 029866 001589

ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.

Üretim Tarihi	XX/20XX
Son Kullanma Tarihi	XX/20XX
Parti No	XXX/20XX
Lisans No	106
Tescil No	

İTHALATÇI:
TEKTAR TEKNİK TARIM TİC. SAN. VE PAZ. A.Ş.
Etiler Mah. Evliya Çelebi Cad. Mirador İş Merkezi
No:3 Kat:4 Ofis No: 25-26 Antalya / TÜRKİYE
Tel: +90.242. 311 56 11 – 312 93 74
Fax: +90.242. 312 93 75
www.tektar.com.tr

ÜRETİCİ:
ALBA MILAGRO S.p.A
Via Corridoni, 19 Parabiago (MI) – ITALY
www.albamilagro.com

TAVSİYE EDİLDİĞİ BİTKİLER VE KULLANIM DOZLARI

Bitki Çeşidi	Doz	Uygulama
Açık Tarla Sebzeleri (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Karpuz, Çilek, Bamya, Havuç, Yeşil Sebzeler v.d.), Soğan, Sarımsak, Süs Bitkileri ve Çiçekler, Bağ, Fındık, Lahana (Lahanagiller), Kereviz, Brokoli, Karnabahar, Ispanak, Marul, Maydanoz, Tütün, v.d., Bahçe kullanımı	Yapraktan, 200 gr/100 lt suya veya 200 gr/da	Sebzelerde fide dikiminden sonra, diğer tüm bitkilerde vejetatif dönem başlangıcından itibaren uygulanmaya başlanır. 10-15 gün ara ile tekrarlanır.
Narenciye, Elma, Kiraz, Şeftali, Erik, Muz, Ceviz, Kayısı, Fıstık, Vişne, Armut, Badem, Nektarin, Zeytin, v.d.	Yapraktan: 200 - 300 gr/100 lt suya veya 200 - 300 gr/da	Tüm bitkilerde vejetatif gelişim döneminden çiçeklenmeye kadar uygulanır. 10-15 gün ara ile tekrarlanır.
Tahıllar, Yem Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Buğday, Arpa, Yulaf, Ayçiçeği, Mısır, Patates, Çeltik, Soya, Yer Fıstığı, Pamuk, Pancar, Nohut, Fasulye, Bezelye, v.d.	Yapraktan: 200 - 300 gr/da	Vejetatif gelişimin başlangıcından itibaren uygulamaya başlanır. Hasada kadar 10-15 günlük ara ile tekrarlanır.

GARANTİ KAPSAMI VE HASAR SORUMLULUĞU - TEKTAR TEKNİK TARIM A.Ş. bu mamulün sadece etiketindeki hususları teyit eder. Bunun dışında hiçbir garanti vermez. Bu mamulün yanlış kullanımından dolayı ortaya çıkabilecek sorumluluk kullanıcıya aittir. Depolama ve imha ile ilgili her türlü davranıştan alıcı ve kullanıcı sorumludur.

UYARI - Çocuklardan, yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz. Koruyucu eldiven kullanınız. Cilt ve göz teması halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Ambalajları ağzı açık ve güneş ışığı altında tutmayınız. Kuru ve rutubetsiz bir ortamda muhafaza ediniz. Elde taşırken ve depolarken dik tutunuz.

DEPOLAMA KOŞULLARI - Bu ürün normal depolama koşullarında ve orijinal ambalajlarında +5 °C ile +35 °C arası sıcaklıkta depolanmalıdır.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ - Gübreyle bulaşık elbiseleri çıkarınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını sabunlu suyla yıkayınız. Hastayı gübreleme sahasından derhal uzaklaştırınız. Beklenmedik bir etki görüldüğünde derhal doktora başvurunuz.

KARIŞABİLİRLİK – Güçlü alkali veya güçlü asidik kimyasal bileşimlerle ve mineral yağlarla karıştırmayınız. Polisülfür, kalsiyum ve bakır içeren bileşiklerle karışım yapmadan önce, ön karışım (kavanoz) testi yapınız. Karışımın fiziki görünümünde bozulma oluyorsa bu karışımı kullanmayınız.

Yaprak ve/veya toprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.